

MALACOFAUNA CIRENAICA  
UNA NUOVA SPECIE DI *HELIX*

---

Dott. LAURA GAMBETTA

---

Il prof. Carlo Anti, della R. Università di Padova, membro della Missione archeologica per l'esplorazione di Cirene, ha in un suo recente soggiorno (Agosto-Settembre 1926) in quella località, fatto una piccola raccolta di animali, tra i quali alcune conchiglie di gasteropodi polmonati, da lui donate al Museo Civico di storia naturale di Genova.

Debbo alla cortesia del prof. Gestro l'aver avuto in esame questa piccola ma interessante collezione di conchiglie, che viene opportunamente a inserirsi fra i risultati di note esplorazioni di naturalisti preclari quali il RUMER, il KLAPTOCZ, il FESTA, il GUIGI e il CREMA, ed oltre a confermare anche per Cirene la presenza dell'*Helix (Euparypha) pisana* Müller e dell'*Helix (Xerophila) icmalea* West., che già si conoscevano per altre località della Cirenaica, ci fa nota una specie di *Helix* del sottogenere *Cryptomphalus* che io ritengo nuova e desidero dedicare al raccoglitore.

Rammarico che la mancanza del corpo del mollusco mi limiti alla sola descrizione della conchiglia, pur pensando che per le raccolte che si vanno intensificando nella colonia libica non sarà difficile addivenire a quella sicura conoscenza anatomica indispensabile per convalidare ogni diagnosi.

***Helix (Cryptomphalus) Antii* n. sp.**

(fig. 1-2)

Conchiglia imperforata, di 4 giri, conico-globulosa, solida, trasparente.

Colore fondamentale giallo-verdognolo; fasce marrone, tre nel secondo, quattro nei due ultimi giri (4 2<sup>3</sup> 4 5): interrotte da chiazze della tinta di fondo.



Fig. 1.




Fig. 2.

Spire a strie longitudinali poco profonde, ben nette nella seconda: nella terza e nella quarta prevale una zigrinatura superficiale che si fa striata avvicinandosi all'apertura; accrescimento graduale, ogni giro essendo ampio quanto il doppio del precedente: l'ultimo scende lento verso il margine columellare, dopo aver incontrato la terza fascia che taglia obliquamente.

Apice conico, liscio, brillante, chiaro.

Apertura trasversalmente ovale, obliqua, mediocre; parete interna bianca, smaltata, con la netta visione delle fasce esterne.

Peristoma interrotto, orlato internamente da un cercine lievemente calloso, bianco smalto; margine columellare obliquo, archiforme, ripiegato sopra l'ombelico con una piega che segue, restringendosi, il margine columellare fino a quello basale.

Altezza: 21 mm. - Larghezza: 28 mm.

Specie basata sopra la conchiglia di un solo esemplare raccolto a Cirene nel Settembre 1926.

L' *H. Antii* è simile, per forma generale, all' *H. Mazzulii* Jan, ma ne differisce per avere l'ultimo giro meno ampio, meno rapidamente obliquo, per l'apertura trasversalmente ovale, la mancanza di *callum*, la differente striatura marcatissima e rasposa al tatto nella *Mazzulii*, la maggiore consistenza dello strato smaltato interno e la conseguente orlatura del peristoma, e per le strisce colorate, diverse da quelle della var. *fasciata*.

*Torino, Istituto di Zoologia, Dicembre 1926.*